



Diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) em Portugal

Mais informações em <https://insaflu.insa.pt/covid19/>

Relatório de situação

12 de julho de 2022

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA) analisou até à data **38671 sequências do genoma do vírus SARS-CoV-2**, obtidas de amostras colhidas em mais de 100 laboratórios/hospitais/instituições representando 304 concelhos.

No âmbito da monitorização contínua da diversidade genética do SARS-CoV-2, têm vindo a ser analisadas uma **média de 515 sequências por semana** desde o início de junho de 2021. Estas sequências foram obtidas de amostras colhidas aleatoriamente em laboratórios distribuídos pelos **18 distritos de Portugal Continental e pelas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira**, abrangendo uma média de 139 concelhos por semana (**Figuras 1 e 2**).



Figura 1. Cobertura geográfica (a nível do Concelho) da última amostragem semanal de âmbito nacional, a qual permitiu obter 563 novas sequências do genoma de SARS-CoV-2, representando 144 concelhos.




Figura 2. Evolução da frequência relativa semanal das (sub)-linhagens de SARS-CoV-2 em circulação em Portugal entre as semanas ISO 22 (31 de maio a 6 de junho, 2021) e 26 (27 junho a 4 de julho de 2022). Os valores acima de cada barra indicam o número de sequências avaliadas por semana no âmbito das amostragens aleatórias nacionais. O gráfico destaca: i) as linhagens BA.1 (e sub-linhagem BA.1.1), as sub-linhagens BA.2 com uma frequência relativa $\geq 1\%$ na semana ISO 25 (análise concluída), assim como a sub-linhagem de interesse BA.2.35 e as linhagens BA.3, BA.4 e BA.5 (todas classificadas como *Omicron* pela OMS); ii) sub-linhagens *Delta* de interesse (AY.1, AY.4.2 e AY.43.5); e iii) variante Alpha. *BA.1.1 = BA.1.1 e sub-linhagens; BA.1 = BA.1 e sub-linhagens (excepto BA.1.1 e descendentes). **É de esperar a existência de algumas flutuações nas frequências apresentadas para a última semana em análise (semana ISO 26), na medida em que ainda estão a ser apurados dados relativos a esse período.



Principais destaques:

A variante de preocupação (VOC) **Omicron**, segundo a classificação da [OMS](https://www.who.int), engloba atualmente várias (sub)linhagens identificadas com o prefixo “BA”. A nomenclatura das diversas sub-linhagens encontra-se em constante revisão e refinamento (<https://www.pango.network/>), sendo que as sequências identificadas em Portugal são re-classificadas semanalmente e o resultado disponibilizado no nosso site <https://insaflu.insa.pt/covid19/>. Sempre que relevante, algumas destas sub-linhagens terão destaque no presente relatório.

• Linhagem BA.5

- A linhagem BA.5 apresenta várias características genéticas de interesse, tais como a presença das mutações **L452R** e **F486V na proteína Spike** (ambas afetam locais da proteína Spike que interagem com as células humanas, medeando a ligação do vírus e/ou o seu escape ao sistema imunitário). Esta linhagem apresenta a deleção del69-70 na proteína Spike responsável pelo perfil “SGTF”, tornando possível monotizar a sua circulação indiretamente através deste indicador. No entanto, devido ao recente decréscimo no número de testes realizados com a metodologia *TaqPath – ThermoFisher* (que permite monitorizar a proporção de amostras com perfil “SGTF”) pelos diferentes laboratórios, os dados SGTF carecem de robustez, pelo que os mesmos deixaram de ser atualizados para a monitorização desta linhagem.
- As amostragens semanais por sequenciação têm mostrado que, após a sua primeira deteção na semana 13, **a linhagem BA.5 é dominante em Portugal desde a semana 19** (9 a 15 de maio, 2022) (**Figura 2**), **apresentado uma frequência relativa de 92,3% de acordo com a mais recente amostragem aleatória por sequenciação na semana 26** (27 junho a 4 julho, 2022).

• Linhagem BA.2

- **Em Portugal, a linhagem BA.2 foi detetada pela primeira vez em amostragens aleatórias por sequenciação na semana 52** (27 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022) (**Figura 2**), tornando-se dominante em Portugal na semana 8 (21 a 27 de fevereiro de 2022). Tendo atingido uma frequência relativa máxima de 95% à semana 13 (28 de março a 3 de abril, 2022), apresenta desde então **uma frequência relativa continuamente decrescente**, tendo deixado de ser dominante desde a semana 19 (9 a 15 maio de 2022), ponto a partir do qual a linhagem BA.5 se tornou dominante em Portugal (**Figuras 2 e 3**). Estima-se que a sua frequência relativa na semana 26 (*dados em apuramento*) seja de 2,6%.
- Entre as **sub-linhagens da BA.2**, tem vindo a ser monitorizada a circulação de duas linhagens, **BA.2.12.1 e BA.2.35, caracterizadas por uma mutação adicional na posição L452 da proteína Spike** (L452Q e L452R, respetivamente). Mutações neste local proteico estão associadas à resistência a anticorpos neutralizantes, tendo sido marcadoras de outras variantes de interesse/preocupação, tais como as variantes *Delta*, *Kappa* e *Omicron* BA.4/BA.5. Enquanto que a linhagem **BA.2.12.1** tem apresentado uma **frequência relativa flutuante nas últimas semanas, não tendo, até à data, ultrapassado os 2%**, a linhagem **BA.2.35** tem apresentado uma frequência relativa decrescente desde a semana 19 (9 a 15 maio, 2022), não tendo sido detectado nenhum caso na semana 26 (*dados em apuramento*).

• Linhagem BA.1

- A **linhagem BA.1** foi identificada pela primeira vez em Portugal em meados de novembro de 2021, tendo sido dominante entre as semanas 51 de 2021 (20 a 26 de dezembro) e 7 de 2022 (14 a 20 de fevereiro) e atingido o pico de circulação na semana 2 (95,6%, 10 a 16 de janeiro, 2022) (**Figura 2**). **Estima-se que a sua circulação seja residual atualmente**, tendo sido detectada a uma frequência inferior a 1% desde a semana 16 (18 a 24 de abril de 2022).



- **Linhagens BA.4 e BA.3**

Desde a semana 19 (9 a 15 de maio de 2022), **foram identificadas 42 sequências da linhagem BA.4 da variante Omicron em Portugal**, associados a casos confirmados em todas as regiões (**Figura 3**). Esta linhagem apresentou uma **frequência relativa de 5,1% na semana 26** (27 junho a 4 julho, 2022; dados em apuramento). À semelhança da linhagem BA.5, com a qual partilha múltiplas mutações de interesse, a linhagem BA.4 (igualmente classificada como VOC) apresenta uma circulação relevante em alguns países, em particular na África do Sul.

Não foi detetado qualquer caso BA.3 em Portugal desde a semana 11 (14 a 20 de março; ver relatório de dia 29 de março de 2022).

- **Recombinantes**


- A co-circulação de várias linhagens/variantes na comunidade aumenta a possibilidade da ocorrência de infeções mistas, isto é, a mesma pessoa ser infectada simultaneamente por mais do que uma delas. Neste contexto, poderá haver mistura de material genético entre essas linhagens, resultando um perfil genético misto, comumente designado de “recombinante”.
- Estão descritos atualmente vários SARS-CoV-2 recombinantes à escala global (ex., Delta+Omicron BA.1 ou BA.1+BA.2), estando a ser atribuídas designações aos recombinantes com maior relevância epidemiológica / funcional. **Em Portugal, os poucos vírus recombinantes identificados até à data foram detetados em casos esporádicos** nas amostragens aleatórias semanais. Entre estes, destacam-se **casos associados aos recombinantes com as designações internacionais XM, XN, XE, XH e XAG**, sendo que todos são caracterizados por um perfil genético híbrido em que uma parte inicial do genoma corresponde à linhagem BA.1 e o restante à linhagem BA.2. À semelhança das restantes SARS-CoV-2 recombinantes detetadas até à data em Portugal, não existe evidência de que apresentem diferenças funcionais (ex., diferenças de transmissibilidade ou de evasão do sistema imunitário) em relação às linhagens parentais.

- No [site](#) podem ser consultadas **tabelas dinâmicas que sumarizam a frequência e dispersão geotemporal das variantes/linhagens identificadas até à data e as mutações de interesse na proteína Spike** em cada uma delas.


As actividades de vigilância laboratorial do SARS-CoV-2 continuarão em articulação com as autoridades de Saúde, mantendo especial foco na detecção de novas introduções e monitorização de variantes a suscitar particular interesse pela comunidade científica e autoridades de Saúde. Neste âmbito, destaca-se a publicação do Diário da República (Despacho n.º 331/2021 - Diário da República n.º 6/2021, Série II de 2021-01-11), a qual determina o reforço da vigilância laboratorial genética e antigénica do vírus SARS-CoV-2, sob coordenação do INSA. Mais detalhes do estudo da diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal, incluindo objectivos, metodologias, colaborações, entre outros, podem ser consultados em <https://insaflu.insa.pt/covid19/>.




AÇORES-RA




MADEIRA-RA




NORTE




CENTRO



ALENTEJO



LX V TEJO



ALGARVE





Figura 3. Evolução da frequência relativa semanal das linhagens por Região de Saúde, entre as semanas ISO 22 (30 de maio a 5 de junho, 2022) e 26 (27 de junho a 4 de Julho, 2022). O gráfico destaca sub-linhagens BA.2 com uma frequência relativa $\geq 1\%$ em pelo menos uma das regiões na semana ISO 25 (análise concluída), as linhagens BA.4 e BA.5 (todas estas classificadas como Omicron pela OMS). * É de esperar a existência de algumas flutuações nas frequências apresentadas para a última semana em análise (semana ISO 26), na medida em que ainda estão a ser apurados dados relativos a esse período.